



L..RU.MKT.CC.09.2018.2385

ТЕРАЛИВ 275

**БЕЗ БОЛИ В СУСТАВАХ
С САМОГО УТРА
И ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА**

Информация для медицинских и фармацевтических работников

ТЕРАЛИВ²⁷⁵

ТЕРАФЛЕКС ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ ОТ СУСТАВНОЙ БОЛИ: ТЕРАЛИВ 275

Тералив 275 – нестероидный противовоспалительный препарат. Активное действующее вещество – напроксен в дозировке 275 мг. Тералив позволяет избавиться от боли в суставах до 12 часов.





- ✓ **Выпускается в упаковках 12 или 24 таблетки**
- ✓ **Обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием**
- ✓ **Показания:**
 - Заболевания опорно-двигательного аппарата с болевым синдромом (ревматическое поражение мягких тканей, остеоартроз периферических суставов и позвоночника и др.)
 - Головная боль и мигрень
 - Зубная боль
 - В качестве комплексной терапии заболеваний уха, горла, носа

СХЕМА ПРИЕМА

**Взрослым и
детям с 15 лет:
по 1 таблетке
2-3 раза в сутки**

ТЕРАФЛЕКС® ХОНДРОКРЕМ ФОРТЕ

СИЛЬНЕЕ СОСТАВ - ЗДОРОВЕЕ СУСТАВ¹

При острой боли в суставах на помощь приходит Терафлекс Хондрокрем Форте в новых объемах: 50 г и 100 г.




Специальный состав² Терафлекс Хондрокрем Форте улучшает проникновение в сустав активных компонентов, что способствует уменьшению боли и воспаления в суставах.



- ♥ **Терафлекс Хондрокрем Форте** способствует уменьшению боли в суставах и оказывает противовоспалительное действие
- ♥ Доказано¹, что **Терафлекс Хондрокрем Форте**:
 - Оказывает обезболивающее действие
 - Обладает противовоспалительным действием
 - Способствует уменьшению скованности
 - Способствует увеличению объёма движения суставов

Благодаря тому, что Терафлекс Хондрокрем Форте содержит мелоксикам и хондроитин, он оказывает комбинированное действие на симптоматику остеоартроза.

Наличие в составе вспомогательного вещества димексид улучшает проникновение компонентов через кожный покров, усиливая действие³.



ТЕРАФЛЕКС®

КАПСУЛЫ ТЕРАФЛЕКС – ПРЕПАРАТ №1⁴ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА И ОСТЕОХОНДРОЗА



Доказано⁵, что Терафлекс способствует:

- Обновлению хрящевой ткани сустава
- Улучшению подвижности суставов
- Уменьшению боли

И препятствует дальнейшему развитию заболевания.⁶

Краткие инструкции по применению.

Терафлекс®. Капсулы, МНН или группировочное название: глюкозамин + хондроитина сульфат. Показания к применению: дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз I-III стадии, остеохондроз. Способ применения и дозы: первые три недели назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки; в последующие дни – по 1 капсуле 2 раза в сутки, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет от 3 до 6 месяцев. При необходимости возможно проведение повторных курсов лечения. Противопоказания: гиперчувствительность, тяжелая хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации, возраст до 15 лет. С осторожностью: сахарный диабет, сердечная и/или почечная недостаточность, бронхиальная астма, повышенная чувствительность к морепродуктам. Побочное действие: возможны нарушения функции со стороны желудочно-кишечного тракта, головная боль, боль в ногах и периферические отеки, сонливость, бессонница, тахикардия, аллергические реакции. Особые указания: уменьшает действие полусинтетических пенициллинов и хлорамфеникола, при одновременном приеме с варфарином следует контролировать свертываемость крови; при появлении нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта дозу препарата следует уменьшить в 2 раза, а при отсутствии улучшения – отменить препарат. Рег. номер: П N015287/01, инструкция по применению от 05.04.2017. Полную информацию смотрите в инструкции по применению, АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Терафлекс® Адванс. Капсулы, МНН или группировочное название: глюкозамин + ибупрофен + хондроитина сульфат. Показания к применению: остеоартроз крупных суставов, остеохондроз позвоночника, сопровождающийся умеренным болевым синдромом. Способ применения и дозы: по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды, запивая небольшим количеством воды. Длительность приема без консультации врача не должна превышать 3 недели. Дальнейшее применение следует согласовать с врачом. Противопоказания: гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП в анамнезе. Эрозивно-язвенные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, болезнь Крона, язвенный колит). Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, респираторного полиноза носа и околоносовых пазух. Подтвержденная гиперкалиемия. Гемфилия и другие нарушения свертываемости крови, геморрагические диатезы. Желудочно-кишечные кровотечения и внутричерепные кровоизлияния. Тяжелая почечная недостаточность, прогрессирующие заболевания почек. Тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени. Период после проведения аортокоронарного шунтирования. Беременность, период лактации. Возраст до 18 лет. С осторожностью: пожилой возраст, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, гастрит, энтерит, колит, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, дислипидемия, заболевания периферических артерий, цереbroваскулярные заболевания. Побочное действие: тошнота, боль в животе, метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции; эти реакции исчезают после отмены препарата. Следует учитывать возможность развития побочных реакций, связанных с присутствующим в препарате ибупрофеном. Особые указания: во время длительного лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек. В период лечения не рекомендуется прием алкоголя. Необходимо учитывать возможные лекарственные взаимодействия. Рег. номер: ЛС-002678, инструкция по применению от 04.07.2016. Полную информацию смотрите в инструкции по применению, АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Терафлекс® Хондрокрем Форте. Крем для наружного применения, МНН или группировочное название: мелоксикам + хондроитина сульфат. Показания к применению: рекомендуется к применению в составе комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеоартроза, остеохондроза позвоночника; иных заболеваний суставов, сопровождающихся болевым синдромом. Способ применения и дозы: слегка втирать полосу крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения – 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Длительность лечения зависит от показаний и ожидаемого эффекта. Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата и к другим нестероидным противовоспалительным средствам, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст до 12 лет. Побочное действие: возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, покраснение, кожная сыпь). Особые указания: следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Рег. номер: ЛП-000276, инструкция по применению от 05.04.2017. Полную информацию смотрите в инструкции по применению, АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Тералив 275. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, МНН или группировочное название: напроксен. Показания к применению: заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматическое поражение мягких тканей, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, в том числе с радикулярным синдромом, тендовагитит, бурсит); болевой синдром слабой или умеренной степени выраженности: невралгия, боли в костях, мышцах, поясничном отделе позвоночника, болевой синдром при растяжениях и ушибах; головная боль, мигрень; алгодисменорея, зубная боль; в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа с выраженным болевым синдромом; лихорадочный синдром при «простудных» и инфекционных заболеваниях. Способ применения и дозы: принимать внутрь с достаточным количеством воды. Рекомендуемая схема терапии: взрослые, дети от 15 лет - суточная доза для облегчения боли составляет 2-3 таблетки (550-825 мг). Максимальная суточная доза – 3 таблетки. Длительность применения - не более 5 дней. В качестве жаропонижающего средства - начальная доза 2 таблетки, далее принимается по 1 таблетке каждые 8 часов. Для предупреждения и лечения приступов мигрени и гемиклологических болей (вкл. менструальные) начальная доза – 2 таблетки (550 мг), далее при необходимости - по 1 таблетке каждые 8-12 часов. Максимальная суточная доза - 3 таблетки. Пациентам старше 65 лет следует принимать препарат по мере необходимости каждые 12 часов. Противопоказания: гиперчувствительность к напроксену или напроксену натрия. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, респираторного полиноза носа или околоносовых пазух и непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) Период после проведения аортокоронарного шунтирования, Эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или 12-перстной кишки, Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) в фазе обострения, Гемфилия и другие нарушения свертываемости крови, Цереbroваскулярное кровоотечение или иные кровотечения, Декомпенсированная сердечная недостаточность, Выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени, Выраженная почечная недостаточность (креатинин креатинина (КК) >30 мг/мл), гиперкалиемия, Беременность, период грудного вскармливания, Детский возраст до 15 лет, С осторожностью: ИБС, цереbroваскулярные заболевания, застойная сердечная недостаточность, дислипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение, нарушение функции почек (КК <30-50 мг/мл), язвенное поражение ЖКТ в анамнезе, диагностированная *Helicobacter rubri*, пожилой возраст, системные заболевания соединительной ткани, длительное применение НПВП, частое употребление алкоголя, тяжелые соматические заболевания, сопутствующая терапия антикоагулянтами, антиагрегантами (например, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел), пероральными глюкокортикоидами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (например, циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин), Побочное действие: возможно развитие печеночной сыпи, перфорации или ЖК кровотечения; эозинофилия, гранулоцитопения, тромбоцитопения; головная боль, головокружение, сонливость, нарушения сна, невозможность концентрироваться; нарушение зрения; шум в ушах, нарушение слуха; ощущение сердцебиения; одышка; запор, боль в животе, диспепсия, тошнота, диарея, кожный зуд, сыпь, жажда, повышенное потоотделение. При терапии НПВП сообщалось о появлении отеков и повышении артериального давления. Особые указания: при лечении антикоагулянтами учитывать, что напроксен может увеличивать время кровотечения; не применять одновременно с ацетилсалициловой кислотой, другими НПВП, может снижаться антигипертензивное действие пропранолола и других бета-адренорецепторов и мочегонное действие диуретиков. Необходимо учитывать все возможные лекарственные взаимодействия. Не превышать доз, указанных в инструкции, следует использовать минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом. Следует избегать приема напроксена в течение 48 часов до хирургического вмешательства. Прием напроксена может влиять на фертильность, не рекомендуется женщинам, планиующим беременность. Каждая таблетка препарата содержит приблизительно 25 мг натрия, учитывать при ограничении потребления соли. Напроксен замедляет скорость реакции и пациентов, учитывать при управлении автомобилем и выполнении задач, требующих повышенного внимания, Рег. номер: ЛП-004892, инструкция по применению от 19.06.2018. Полную информацию смотрите в инструкции по применению, АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

1. По данным клинического исследования 90 пациентов с остеоартрозом хороший эффект терапии с применением комбинации мелоксикама и хондроитина отметили 91% пациентов по сравнению с 33,3% пациентов в группе оригинального диклофенака в форме эмульгеля, Бадокин В.В. Новые возможности лечения остеоартроза: комбинированная форма мелоксикама и хондроитина сульфата // РМЖ. - 2013. - №3. - с.139-142.
2. За счет своего действия, противовоспалительного компонента
3. Арадийская Е.Г., Соколовский Е.В., Бактина С.М., Пелинцев М.В. Роль основы в глюкокортикостероидных препаратах: оптимальный состав и механизм действия // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - №2. - с.64-70.
4. Согласно данным базы «ИЖКЮБИА Солушнс» - «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ» торговое наименование Терафлекс является лидером по объему продаж в аптеках и в розничных ценах в группе O2G2C «Препараты для суставов системные, в капсулах/таблетках» (классификация ОТС) за период июль 2017-июль 2018
5. Чинцова Н.В. Лечение боли у пациентов с остеоартрозом различной локализации // Медицинский совет. - 2014. - №17. - 96-102.
6. Через 3 года терапии препаратом Терафлекс число больных с рентгенологическим прогрессированием гонартроза отличалось на 25% от контрольной группы (p<0,05), Светлова М.С. Патогенетическое лечение остеоартроза коленных суставов // Современная ревматология. - 2012. - №3. - с.44-49.
7. Фрязан М. и др. Применение глюкозамина и хондроитина для лечения остеоартрита коленного сустава: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование по оценке монотерапевтического и комбинированного режима терапии, Анналы ревматических заболеваний, 2015, Май; 74(5):851-8



БРЕНД ТЕРАФЛЕКС. ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ



НОВИНКА

ТЕРАФЛЕКС. СИЛЬНЕЕ СОСТАВ – ЗДОРОВЕЕ СУСТАВЫ